

1-1**طبيعية الضوء:**

للضوء طبيعة ثنائية: ١- موجية ٢- جسيمية .

يعد الضوء المرئي نوعاً من الإشعاع الكهرومغناطيسي .

الطبيعة الموجية للضوء : هو شكل من أشكال الطاقة الذي يسلك السلوك الموجي في أثناء انتقاله في الفضاء.

أمثلة للأشعة الكهرومغناطيسية:-

١- الميكرويف والأشعة السينية وموجات برامج المذياع والجالات والتلفزيون.

اقتراحات رذرفورد:-

اقترح رذرفورد ان شحنة نواة الذرة موجبة وأن كتلة الذرة متمركزة في النواة المحاطة بالإلكترونات سريعة الحركة.

اكتشاف العلماء للغز السلوك الكيميائي:-

بدنوا في اكتشاف ذلك اللغز في أوائل القرن التاسع عشر إذا لاحظوا انبعث ضوء مرئي من عناصر معينة عند تسخينها بواسطة اللهب. وأظهر تحليل هذا الضوء المنبعث ارتباط سلوك العنصر الكيميائي بتوزيع الإلكترونات في ذراته.

(خصائص الموجات)


أ) الطول الموجي :- هو أقصر مسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليتين.

ويرمز له بالرمز لمدا (λ) ويقاس بالنانومترات أو السنتيمترات.

ب) التردد :- هو عدد الموجات التي تعبر نقطة محددة خلال ثانية

ويرمز له بالرمز ν ويقاس بوحدة Hz وفي الحسابات (s^{-1})

ج) سعة الموجة :- تعرف بأنها مقدار ارتفاع القمة أو انخفاض القاع من مستوى خط الأصل.



(د) سرعة الضوء:- تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية ومنها الضوء المرئي بسرعة ثابتة

$$3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

معدل سرعة الموجة الكهرومغناطيسية.

c : سرعة الضوء في الفراغ.

$$c = \lambda \nu$$

λ : الطول الموجي.

سرعة الضوء في الفراغ

ν : التردد.

تساوي حاصل ضرب التردد

في الطول الموجي

تختلف الموجات الكهرومغناطيسية عند بعضها البعض في التردد والطول الموجي وهي علاقة عكسية

وتتشابه في السرعة.

الطيف الكهرومغناطيسي :- هو عبارة عن سلسلة من الموجات المتصلة التي تسير بسرعة الضوء والتي تختلف في التردد والطول الموجي فقط.

- نحلل الألوان عن طريق المنشور وينتج سلسلة من الألوان :
(أحمر ، برتقالي ، أصفر ، أخضر ، أزرق ، نيلي ، بنفسجي)

(الطبيعة المادية للضوء)

مفهوم الكم:- أنه يمكن للمادة أن تكسب أو تخسر طاقة على دفعات بكمية صغيرة محددة.

مثال / عند تسخين قطعة حديدية تشع ضوء وكلما زادت حرارتها تتحول الى لون أحمر ثم برتقالي وإذا زادت الحرارة تتحول الى لون أحمر. وكلما سخن الحديد زادت طاقته.

تعريف الكم:- هو أقل كمية من الطاقة يمكن أن تكسبها الذرة أو تفقدها.

حيث E طاقة الكم.	$E_{\text{quantum}} = h\nu$	طاقة الكم:-
h ثابت بلانك.	طاقة الكم تساوي حاصل ضرب ثابت	
ν التردد.	بلانك في تردد الضوء.	

ثابت بلانك :- يساوي $6.626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$ واقترح بلانك أن الطاقة المنبعثة من الأجسام الساخنة كمكأة.

التأثير الكهروضوئي:- تتبعث الإلكترونات المسماة الفوتوالكترونات من سطح الفلز عندما يسقط ضوء بتردد معين أو اعلى منه على سطح الفلز.

تعريف الفوتون:- جسيم لاكتلة له يحمل كمأ من الطاقة.

طاقة الفوتون:- طاقة الفوتون تساوي حاصل ضرب ثابت بلانك في تردد الضوء. $E_{\text{فوتون}} = h\nu$

(الضوء عبارة عن موجات وجسيمات (الفوتون)

الضوء النازل على معدن هو الفوتون والصادر من المعدن هو الفوتوالكترونات.

(طيف الانبعاث الذري)

(١) كيف ينتج الضوء في مصابيح النيون؟

ينتج ضوء النيون عند مرور الكهرباء في انبوب ملئ بغاز النيون حيث تمتص ذرات النيون الطاقة وينتقل إلى حالة عدم الاستقرار (إثارة) ولكي تعود إلى حالة الاستقرار ينبغي ان تبعث ضوء لكي تطلق الطاقة التي امتصتها.

(٢) تعريف طيف الانبعاث الذري:

طيف الانبعاث الذري لعنصر ما هو مجموعة من ترددات الموجات الكهرومغناطيسية المنطلقة من ذرات العنصر.

(٣) أمثلة على طيف الانبعاث الذري:

١. اللبنة ٢. الاسترانشيوم يعرض على لهب يعطي لون أحمر مميزاً.

(٤) استخدامات طيف الانبعاث الذري:

يستخدم لتعرف العنصر أو تحديد ما إذا كان ذلك العنصر جزءاً من مركب.

٨. **الفكرة الرئيسة** قارن بين الطبيعة الموجية والطبيعة المادية للضوء.
٩. صف الظاهرة التي يمكن أن تُفسّر بواسطة النموذج المادي للضوء فقط.
١٠. قارن بين الطيف المستمر وطيف الانبعاث.

٨. الطبيعة الموجية: الضوء يسلك سلوك الموجات. أما الطبيعة المادية: الضوء يسلك سلوك الجسيمات.
٩. الأجسام الساخنة.
١٠. حلها بالملزمة.

التقويم 1-1

الخلاصة

- تُعرّف الموجات كلها بالطول الموجي، التردد، السعة، والسرعة.
- تنتقل الموجات الكهرومغناطيسية جميعها بسرعة الضوء في الفراغ.
- للموجات الكهرومغناطيسية كلها خواص موجية ومادية.
- تبعث المادة الطاقة وتمتصها بكميات محددة.
- ينتج الضوء الأبيض طيفاً مستمراً. ويتكون طيف انبعاث العنصر من سلسلة خطوط ملونة ومتفصلة.

1-2

اقتراحات بور:-

- ١- اقترح ان لذرة الهيدروجين مستويات طاقة معينة يسمح للإلكترونات أنو توجد فيها.
- ٢- اقترح ان الإلكترون في ذرة الهيدروجين يتحرك حول النواة في مدارات دائرية.
- ٣- اقترح ان ذرة الهيدروجين تكون في حالة استقرار واذا امتص الإلكترونات طاقة يصعد إلى أعلى وحتى ينزل الى اسفل يطلق هذه الطاقة ويشع ضوء.
- ٤- خصص لكل مدار عدد صحيح يسمى العدد الكمي (n).
- ٥- كلما بعدنا عن النواة زادت الطاقة (حالة إثارة).

حدود نموذج بور:-

- ١- انه لم يستطيع تفسير طيف أي عنصر آخر. (اعتمد على الهيدروجين فقط لانه سهل)
- ٢- انه لم يفسر السلوك الكيميائي للذرات.

بعض المفاهيم الرئيسية

حالة الاستقرار	هي الحالة التي تكون إلكترونات الذرة فيها ادنى طاقة.
حالة الاثارة	هي الحالة التي تكتسب إلكترونات الذرة الطاقة فتصبح في حالة إثارة.
العدد الكمي	هو العدد المخصص لوصف الإلكترونات في مجالات الطاقة الرئيس (n)

النموذج الميكانيكي للذرة) ص ٢٥

- ١- مبدأ دي برولي:- اعتقد دي برولي أن للجسيمات المتحركة خواص الموجات.

<u>العلاقة بين الجسيم والموجة الكهرومغناطيسية</u>		
λ تمثل طول الموجة	v تمثل التردد	$\lambda = \frac{h}{mv}$
m تمثل كتلة الجسيمات	h ثابت بلانك	
طول موجة الجسيم هي النسبة بين ثابت بلانك، وناتج ضرب كتلة الجسيم في تردده.		

اشتق دي برولي المعادلة التالية:

٢- **مبدأ هايزنبرج للشك:-** ينص على أنه من المستحيل معرفة سرعة جسيم ومكانه في الوقت نفسة بدقة.

٣- **معادلة شرودنجر الموجية:-** اشتق شرودنجر معادلة على اعتبار أن الكترون ذرة الهيدروجين موجة. وظهر أن نموذج شرودنجر لذرة الهيدروجين ينطبق جيداً على جميع العناصر الأخرى.


النموذج الميكانيكي الكمي للذرة (النموذج الموجي الميكانيكي) :- هو نموذج يعامل الالكترونات على أنها موجات.

٤- **المستوى والسحابة.**

المستوى:- يصف الموقع المحتمل لوجود إلكترون

السحابة:- مناطق حول النواة يحتمل أن يوجد فيها الالكترون.

(السحابة الالكترونية تكون أكثر كثافة عند النواة.)



(مستويات ذرة الهيدروجين)

عدد الكم الرئيس (n)	المستويات الثانوية	المستويات الفرعية	مجموع المستويات الفرعية
1	s	1	1
2	s p	1 3	4
3	s p d	1 3 5	9
4	s p d f	1 3 5 7	16

التوزيع الإلكتروني:- هو ترتيب الإلكترونات في الذرة.

(يحدد التوزيع الإلكتروني في الذرة باستخدام ثلاث قواعد.)

مبدأ أوفباو(البناء التصاعدي):- ينص على أن كل إلكترون يشغل المستوى الأقل طاقة.

مبدأ باولي:- ينص على أن عدد إلكترونات المستوى الفرعي الواحد لا يزيد عن الإلكترونين ويدور كل منهما حول نفسه باتجاه معاكس للآخر.

قاعدة هوند:- تنص على أن الإلكترونات تتوزع في المستويات الفرعية المتساوية الطاقة بحيث تحافظ على أن يكون لها الاتجاه نفسه من حيث الدوران،

هناك ثلاث طرق لكتابة التوزيع الإلكتروني هي:

١- (الترميز الإلكتروني)

٢- (رسم مربعات المستويات)

مثال/ لرسم مربعات المستويات يجب ان نمثل بالتوزيع الالكتروني او ترميز الغاز النبيل حتى نرسم مربعات المستويات.

S $\uparrow \downarrow$ يوجد به مربع واحد لان عدد المستويات الفرعية به 1 و به الكترونين اذاً نمثل له سهمين الأول على فوق والثاني ع تحت

P $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ يوجد به ثلاث مربعات لان عدد المستويات الفرعية 3 و به 6 اسهم لان عدد الكتروناته 6 ونبدأ الاسهم اولا بالاعلى.

وهكذا لـ d و f .



توجد هناك حالة شاذة بالتوزيع الالكتروني إذا كان d وصل عدد الكتروناته ٤ أو ٩ نستلف من الذي قبلة حتى يكمل الـ ٥ أو الـ ١٠. (ليستقر)

٣- ترميز الغاز النبيل:- يجب حفظ هذه حتى نتقن طريقة الغاز النبيل

م	رمز الاختصار	توزيع الإلكترونات	من - إلى (حسب العنصر)
1	{ ${}^2\text{He}$ }	2s 2p	3 - 9
2	{ ${}^{10}\text{Ne}$ }	3s 3p	11 - 17
3	{ ${}^{18}\text{Ar}$ }	4s 3d 4p	19 - 35
4	{ ${}^{36}\text{Kr}$ }	5s 4d 5p	37 - 53
5	{ ${}^{54}\text{Xe}$ }	6s 4f 5d	54 - 85

التمثيل النقطي للإلكترونات (تمثيل لويس)

مثال/ أولاً نمثل العنصر بأي طريقة سواء كانت بالترميز الإلكتروني أو بالغاز النبيل .

ومن ثم نأخذ أكبر عدد رئيسي ونجمع إلكتروناته ونمثل رمز العنصر محاطاً بنقاط (عدد النقاط على عدد الإلكترونات)

مثال/ Xe - { ${}^{36}\text{Kr}$ } = $\ddot{5s}^2 4d^{10} 5p^6$ - ${}^{54}\text{Xe}$

الكثرونات التكافؤ:- تعرف بأنها إلكترونات المستوى الخارجي للذرة.

نجمع الكثرونات حقت أكبر مستوى.

مراجعة التقويم ص ١٤

2-1

المساهمات في تصنيف العناصر

<ul style="list-style-type: none"> • رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. • لاحظ تكرار خواص العناصر لكل ثمانية عناصر. • وضع قانون الثمانيات. 	جون نيولاندز
<ul style="list-style-type: none"> • رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. • أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر. 	لوثر ماير
<ul style="list-style-type: none"> • رتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية. • أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر. • تنبأ بوجود عناصر غير مكتشفة، وحدد خواصها. 	ديمتري مندليف
<ul style="list-style-type: none"> • اكتشف أن العناصر تحتوي على عدد فريد من البروتونات سماه العدد الذري. • رتب العناصر تصاعدياً وفق العدد الذري، مما نتج عنه نموذج لدورية خواص العناصر. 	هنري موزلي

- يتشابهون جميعهم في ترتيب العناصر وفق الكتل الذرية. (ماعد موزلي)

(الجدول الدوري الحديث)

يتكون الجدول الدوري الحديث من مجموعة مربعات يحتوي كل مربع على:

اسم العنصر ورمزه وعدده الذري وكتلته الذرية . ورتبت العناصر تصاعدياً حسب العدد الذري في سلسلة من الأعمدة وتعرف بالمجموعات أو العائلات، وفي صفوف تعرف بالدورات.

الدورات = 7 - المجموعات = 18

تصنف العناصر الى فلزات ولافلزات واشابة فلزات.

الفلزات :- عناصر تكون ملساء ولامعة وصلبة وجيدة التوصيل بالكهرباء.

اللافلزات:- غازات أو مواد صلبة هشة ذات لون داكن ورديئة التوصيل بالكهرباء والحرارة.

أشابة الفلزات:- خواص فيزيائية وكيميائية مشابهة للفلزات واللافلزات.

- **العناصر الممثلة:-** هي العناصر من مجموعة 1 و 2 ومن 13-18.
- **العناصر الانتقالية:-** هي العناصر من مجموعة 3 إلى 12.
- **العناصر القلوية:-** هي عناصر المجموعة 1 (ماعدا الهيدروجين).
- **العناصر القلوية الأرضية:-** توجد هذه الفلزات في المجموعة 2 .
- **تقسم العناصر الانتقالية إلى :**
 - ١- **فلزات انتقالية :** تكون من مجموعة 3 إلى 12.
 - ٢- **فلزات انتقالية داخلية:-** تقعان أسفل الجدول الدوري، وهي تنقسم إلى سلسلتين: اللانثانيدات و الأكتينيدات.
- **الهالوجينات:-** هي عناصر المجموعة 17 .
- **العناصر النبيلة:-** هي عناصر المجموعة 18.

2-2

رتبت العناصر في الجدول الدوري ضمن مجموعات حسب توزيعها الإلكتروني.

عدد إلكترونات التكافؤ للمجموعة الأولى 1 والمجموعة الثاني 2 في حين أن لعناصر المجموعة 13 ثلاثة إلكترونات وهكذا أما 18 ففي كل منها 8 إلكترونات ماعدا الهيليوم.

طريقة تحديد الفئة والدورة والمجموعة لكل عنصر حسب توزيعه الإلكتروني.

ينقسم الجدول الدوري إلى أربع فئات s p d f .

١- **الفئة s :**

رقم المجموعة هو عدد إلكترونات s - **الدورة** أكبر مستوى - **الفئة** آخر رمز .

٢- **الفئة p :**

رقم المجموعة = عدد إلكترونات s + عدد إلكترونات p + 10 - **الدورة** أكبر مستوى - **الفئة** آخر رمز.

٣- **الفئة d :**

رقم المجموعة = عدد إلكترونات s + عدد إلكترونات d - **الدورة** أكبر مستوى - **الفئة** آخر رمز.

2-3

نصف قطر الذرة:- هو نصف المسافة بين نوى الذرة المتطابقة والمتحدة كيميائياً بروابط فيما بينهما.

ينقص نصف القطر عند الانتقال من اليسار إلى اليمين عبر الدورة.

يزداد نصف القطر كلما اتجهنا إلى أسفل عبر المجموعة.

الأيون:- هو ذرة أو مجموعة ذرية لها شحنة موجبة أو سالبة.

طاقة التأين:- هي الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من ذرة العنصر في الحالة الغازية.



الكهروسالبية:- تعرف على أنها مدى قابلية ذرات العنصر على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية.

المجموعة	1	2	13	14	15	16	17	18
الفقد والإكتساب	+1	+2	+3	±4	-3	-2	-1	صفر
مثال	Na^+	Ca^{+2}	Al^{+3}	-	N^{-3}	O^{-2}	F^-	-
	فقد			-	اكتساب			

- كلما زاد فقد الإلكترون قل حجم الأيون. (علاقة عكسية)
- كلما زاد عدد الإلكترونات المكتسبة زاد الحجم. (علاقة طردية)

طاقة التأين والكهروسالبية خلال الدورة:-

طاقة التأين والكهروسالبية خلال المجموعة:-



تزيد طاقة التأين والكهروسالبية عند الانتقال من اليسار إلى اليمين

في المجموعة 18 طاقة التأين تكون أعلى شئ أما الطاقة الكهروسالبية تكون صفر. (أقل شئ).

القاعدة الثمانية:- تنص على أن الذرة تكتسب الإلكترونات أو تخسرها أو تشارك بها لتستقر. وهذه القاعدة لا تشمل المجموعة الأولى لأنها تحتاج إلى إلكترونين فقط.

3-1

الأيون:- ذرة لها شحنة موجبة أو سالبة.

الأيون الموجب:- يتكون عندما تفقد الذرة الإلكترونات.

رقم المجموعة	مثال	التوزيع الإلكتروني (الغاز النبيل)	عدد الإلكترونات المفقودة	رمز الأيون
1	3Li	[He] 2s ¹	1	Li ⁺
2	20Ca	[Ar] 4s ²	2	Ca ⁺²
13	13Al	[Ne] 3s ² 3p ¹	3	Al ⁺³

- إذا كان عد الألكترونات 1, 2, 3 يفقد على عدد الكتروناته.

الأيون السالب:- يتكون عندما تكتسب الذرة إلكترون أو أكثر.

رقم المجموعة	مثال	التوزيع الإلكتروني (الغاز النبيل)	عدد الإلكترونات المكتسبة	رمز الأيون
15	7N	[He] 2s ² 2p ³	3	N ⁻³
16	8O	[He] 2s ² 2p ⁴	2	O ⁻²
17	17Cl	[Ne] 3s ² 3p ⁵	1	Cl ⁻

- إذا كان مجموع عدد الإلكترونات 5, 6, 7 يكتسب حتى يصل إلى 8 إلكترونات.

فلزات المجموعة 1 و 2 أكثر الفلزات نشاطاً في الجدول الدوري.

الأيون السالب يسمى أيضاً **بالانيون**. - الأيون الموجب يسمى **بالكاتيون**

3-2

تتجاذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة لتكون مركبات أيونية متعادلة كهربائياً.

الرابط الأيونية	هي القوة الكهروستاتيكية التي تجذب الأيونات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية
المركبات الأيونية	هي المركبات التي تحتوي على روابط أيونية.

س/ كيف تتكون المركبات الأيونية للعناصر التالية:

Cl, Ca

أولاً/ نوزع بالغاز النبيل ثم نرى هل هي تكتسب أم تفقد.



الشبكة البلورية :- تركيب هندسي للجسيمات ثلاثي الأبعاد.

خواص فيزيائية للمركبات الأيونية:- مواد صلبة وهشة – تمتاز بان لها درجات انصهار عالية – تذوب في الماء.

الإلكتروليت:- محلول مصهور يوصل الكهرباء.

طاقة الشبكة البلورية:- هي الطاقة اللازمة لفصل الأيونات عند بعضها البعض في المركب الأيوني.

(١) **مقدار الشحنة:** طردية؛ كلما زادت طاقة الشبكة البلورية مع زيادة الموجب والسالب.

(٢) **حجم الأيون:** عكسية ؛ كلما كان حجم الأيون اصغر زادت طاقة الشبكة البلورية. والعكس

3-3

وحدة الصيغة الكيميائية:- تمثل أبسط نسبة عددية بين الأيونات.


عدد التأكسد:- شحنة الأيون الأحادي.

الايون الاحادي الذرات :- ذرة عنصر تكتسب أو تفقد الكترون أو اكثر.

رقم المجموعة	1	2	3	15	16	17
عدد التأكسد	1+	2+	3+	-3	-2	-1


- الموجب في اليسار والسالب في اليمين
- المتشابهة تروح مع بعض.

أمثلة لصيغ المركبات الأيونية التالية:




Mg , Cl

الصيغة النهائية: **Mg Cl₂**



Br , Al

الصيغة النهائية: **Al Br₃**




Ca , S

الصيغة النهائية: **Ca S**

صيغ المركبات الأيونية العديدة الذرات: يجب حفظ هذه الأيونات العديدة الذرات:

الأيون	الاسم	الأيون	الاسم
ClO_2^-	الكلورايت	NH_4^+	الأمونيوم
ClO_3^-	الكلورات	NO_2^-	النيتريت
IO_3^-	الأيودات	NO_3^-	النترات
CO_3^{2-}	الكربونات	OH^-	الهيدروكسيد
SO_3^{2-}	الكبريتيت	CN^-	السيانيد
SO_4^{2-}	الكبريتات	HCO_3^-	البيكربونات
		PO_4^{3-}	الفوسفات

لكتابه صيغ المركبات الأيونية العديدة الذرات مثل :



١) الكالسيوم والكلورات

الصيغة النهائية: **Ca (ClO₃)₂**

أسماء الأيونات والمركبات الأيونية:- **اليمين**

(١) إذا كان الأيون **السالب** **احادي الذرة** .

اسم الأيون السالب + (يد) + اسم الايون الموجب .

أمثلة/ كلوريد الصوديوم : Na Cl

(٢) إذا كان الأيون **السالب** **عديد الذرات** : ← **الجدول ص ٩٩ (ص ١٣)**

اسم الايون السالب + اسم الايون الموجب .

أمثلة/ نترات الصوديوم : Na No₃

(٣) إذا كان الايون الموجب له أكثر من عدد تأكسد .

يضاف رقم التأكسد إلى اخر اسم الايون الموجب .

Fe₂ O₂ : أكسيد الحديد (II)

المجموعة	الأيونات الشائعة
6	Cr^{+3} , Cr^{+2}
8	Fe^{+3} , Fe^{+2}
11	Cu^{+} , Cu^{+2} , Ag^{+} , Au^{+} , Au^{+3}

الباب الثالث

الدرس الرابع:- الروابط الفلزية وخواص الفلزات

ص 88

3-4

الرابطية الفلزية:- هي قوة التجاذب بين الايونات الموجبة للفلزات والالكترونات الحرة في الشبكة الفلزية .

خواص الفلزات :- (١) ملساء (٢) لامعة (٣) صلبة في درجة حرارة الغرفة

(٤) جيدة التوصيل بالحرارة والكهرباء (٥) قابلة للطرق والسحب .

تعريف السبائك:- هي خليط من العناصر ذات الخواص الفلزية الفريدة .

أمثلة على السبائك:- (١) الفولاذ (٢) البرونز (٣) الحديد الزهر .


4-1

الرابطة التساهمية:- هي الرابطة الكيميائية التي تنتج عن مشاركة كلاً من الذرتين الداخلتين في تكوين الرابطة بزوج إلكترونات أو أكثر. ويتكون **الجزئ** عندما ترتبط ذرتان أو أكثر برابطة تساهمية.

الروابط التساهمية الأحادية:

هي عندما يشترك زوج واحد من الإلكترونات في تكوين رابطة.

النقاط الحمراء هي زوج رابط وهي الأساس الكرتون
فردى لآكن آمعاها آتى آصل لآالة الاستآرار.



تمثل النقاط على عقارب الساعة

الهيدروجين يستقر بزوج واحد فقط
(الكترنين) ووضعنا اثنين H لان

المجموعة	1	2	13	14	15	16	17
عدد النقاط التي نضعها فوق العنصر	1	2	3	4	5	6	7

تسمى الرابطة التساهمية الأحادية روابط سيجما، ويرمز إليها بالرمز σ

الروابط التساهمية المتعددة:

أ. الروابط الثنائية:-



نوع الروابط: σ ، (π)

دائماً الأولى سيجما والبقية باي (على عدد الروابط التساهمية)

ب. الروابط الثلاثية:-



نوع الروابط: σ ، $2(\pi)$

الروابط الثنائية:- تتكون هذه الروابط عندما تشترك ذرتان بزوجين من الإلكترونات فيما بينهما.

الروابط الثلاثية:- تتكون هذه الروابط عندما تشترك ذرتان في ثلاثة أزواج من الإلكترونات فيما بينهما.

قوة الرابطة التساهمية:

الروابط الأحادية: **طويلة** : **ضعيفة** : **طاقة تفكك منخفضة** : $H-F$

الروابط الثنائية: **قصيرة** : **قوية** : **طاقة تفكك عالية** : $O=O$

الروابط الثلاثية: **قصيرة جداً** : **قوية جداً** : **طاقة تفكك عالية جداً** : $N \equiv N$

طاقة تفكك الرابطة: هي الطاقة اللازمة لكسر الرابطة التساهمية.

عند تكوين الرابطة: ينتج عنه طاقة.

عند كسر الرابطة: يحتاج إلى طاقة.

التفاعل الماص للطاقة	التفاعل الكيميائي الذي يحتاج إلى كمية من الطاقة لكسر الروابط الموجودة في المواد المتفاعلة أكبر من الطاقة التي تتبعث عندما تتكون روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة.
التفاعل الطارد للطاقة	التفاعل الكيميائي الذي يرافقه انبعاث طاقة أكبر من الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيئات المواد المتفاعلة.

الباب الرابع

الدرس الثاني:- تسمية الجزيئات

ص 126

4-2

طريقة تسمية الجزيئات :

إذا ما كان فيه
رقم يصبح أول

O : أكسيد **F : فلوريد**
Cl : كلوريد **Cl : كلوريت**
Br : بروميد **N : نتريد**
H : هيدريد

مثال/

P_2O_5
خامس + العنصر (يد) + ثاني + الفوسفور

تصبح: خامس أكسيد ثاني الفوسفور.

امثلة/

SO_3 : ثالث أكسيد الكبريت

CO : أول أكسيد الكربون

توجد اسماء شائعة (توجد باخر ص ١٧)

N_2O : أول أكسيد ثاني النيتروجين

H_2O : أول أكسيد ثاني الهيدروجين

NH_3 : ثالث هيدريد النيتروجين

N_2O_5 : خامس أكسيد ثاني النيتروجين

H_2O_2 : ثاني أكسيد ثاني الهيدروجين

SO_2 : ثاني أكسيد الكبريت

تسمية الأحماض:

١. تسمية الأحماض الثنائية:- وهي تكون الهيدروجين وعنصر آخر .

القاعدة: حمض + الهيدرو + اسم العنصر الذي بعد الهيدروجين + يك

مثال/

حمض الهيدروكلوريك : HCl

حمض الهيدروكبريتيك : H_2S

2. تسمية الأحماض الأكسجينية:- تحتوي على الهيدروجين مع ايون اكسجيني.

له قاعدتان :

القاعدة 1 : حمض + الايون الاكسجيني (بدون آت) + يك. (تنتهي بـ آت)

أمثلة/ حمض الكبريتيك : H_2SO_4 حمض الفوسفيك : H_3PO_4

حمض النيتريك : HNO_3 حمض الكربونيك : H_2CO_3

القاعدة 2 : حمض + الايون الاكسجيني (بدون يت) + وز. (تنتهي بـ يت)

أمثلة/ حمض النيتروز : HNO_2 حمض الكلوروز : $HClO_2$

حمض الكبريتوز : H_2SO_3

الاسم	الأيون	الاسم	الأيون
الأمونيوم	NH_4^+	الكلورايت	ClO_2^-
النيتريت	NO_2^-	الكلورات	ClO_3^-
النترات	NO_3^-	الأيودات	IO_3^-
الهيدروكسيد	OH^-	الكربونات	CO_3^{2-}
السيانيد	CN^-	الكبريتيت	SO_3^{2-}
البيكربونات	HCO_3^-	الكبريتات	SO_4^{2-}
الفوسفات	PO_4^{3-}		


صيغ بعض المركبات التساهمية وأسمائها

الصيغ الجزيئية	الاسم الشائع	اسم المركب الجزيئي
H_2O	ماء	أكسيد ثنائي الهيدروجين
NH_3	أمونيا	ثالث هيدريد النيتروجين
N_2H_4	هيدرازين	رابع هيدريد ثنائي النيتروجين
HCl	حمض الكلور	حمض الهيدروكلوريك

4-3

الصيغ البنائية:- النموذج الجزيئي الذي يستخدم الرموز والروابط لتوضيح المواقع النسبية للذرات ، ويمكن التنبؤ بالعديد من الصيغ البنائية للجزيئات بعد رسم تركيب لويس لها.

تركيب لويس لمركب تساهمي له روابط أحادية:- **مثال/**




ومن ثم نقسم 8 على 2 = 4 أزواج

نمثل : تبقى زوج واحد نضعه على

الذرة المركزية.

مثال 2.




مثال 3.

تركيب لويس للأيون المتعدد الذرات :

مثال / PO_4^{3-}

← لان الاس -3 فنزود ، اذا كان بالموجب ننقص

$$= 32 \quad , \quad 32 \setminus 2 = 16$$




أشكال الرنين:-

الرنين : كتابة صيغ لويس بأكثر من شكل.

يحتاج لتكون الرنين أن يحتوي الجزيء أو الأيون على روابط أحادية وثنائية بنفس الوقت

مثال / رسم ثلاث أشكال رنين للأيون المتعدد الذرات NO_3^-

$$24 = 1 + (6 \times 3) + (1 \times 5) \quad , \quad 12 \text{ زوج}$$



١. اذا كان مجموع الكثرونات التكافؤ فردي .

٢. حالة الاستقرار بأقل من ثمانية الكثرونات.

٣. الاستقرار بأكثر من ثمانية الكثرونات.

الرابطية التساهمية التناسقية : تتكون عندما تقدم إحدى الذرات إلكترونين لتشارك بهما ذرة أخرى أو أيونا آخ بحاجة إلى الكثرונים ليكونا ترتيبا الكترونيا مستقرا بأقل طاقة وضع.

4-4

يسمى النموذج المستخدم في تحديد شكل الجزيء نموذج VSEPR (التنافر بين أزواج الكثرونات التنافر)

التهجين : يحدث التهجين عند دمج شيتين معاً.

حل سؤال: ما شكل الجزيئات التالية وما مقدار زاوية الرابطة ونوع التهجين:

نعمل الحسابات

BF₃ (A)

$$16 = (7 \times 2) + (2 \times 1) \text{ ، ، } 16 \div 2 = 8 \text{ أزواج.}$$



الأزواج المشتركة 2

الأزواج الغير المرتبطة 0 (على الذرة المركزية لا يوجد أزواج).

ننظر الى الجدول بالصفحة التالية:

الاشكال الفراغية للجزيئات

الجزيء	العدد الكلي للارواج الموجودة على الذرة المركزية (المشتركة وغير المشتركة)	الارواج المشتركة (ارواج على الذرة المركزية لكن تكون مشتركة مع عناصر اخرى)	الارواج الغير المرتبطة (ارواج على الذرة المركزية لكن ليست مشتركة)	المستويات المهجنة (نوع التهجين)	اشكال الجزيئات
BeCl₂	2	2	0	sp	خطي 180
AlCl₃	3	3	0	sp ²	مثلث مستو 120
CH₄	4	4	0	sp ³	رباعي الاوجة منتظم 109.5
PH₃	4	3	1	sp ³	مثلث هرمي 107.3
H₂O	4	2	2	sp ³	منحن 104.5
NbBr₅	5	5	0	sp ² d	ثنائي الهرم مثلثي رجوع للكتاب
SF₆	6	6	0	sp ³ d ²	ثماني الاوجة منتظم رجوع للكتاب

شرح مفصل :

BeCl₂	AlCl₃
CH₄	PH₃
H₂O	NbBr₅


4-5

يعتمد نوع الرابطة الكيميائية على مقدار جذب كل ذرة للإلكترونات في الرابطة.

فرق الكهروسالبية ونوع الرابطة	
رابطة أيونية	أكبر من 1.7
رابطة تساهمية قطبية (موجب وسالب)	بين 0.4 - 1.7
رابطة تساهمية غير قطبية (ممكن تكون قطبية لكنها ضعيفة)	أقل 0.4

مركبات تحوي روابط قطبية ولكنها ليست قطبية:

جزيء متماثل (قطبي)



مثال/

/ C Cl_4


وإذا كانت خطية تكون غير قطبية أيضاً

5-1

الحسابات الكيميائية:- هي دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي .

قانون حفظ الكتلة: كتلة المواد المتفاعلة = كتلة المواد الناتجة.

مثال/ فسر معادلة احتراق البروبان باستخدام عدد الجسيمات وعدد المولات ثم طبق قانون حفظ الكتلة.



أولاً/ نحسب الكتلة المولية لكل جزئ (على جمب)

ثانياً/ نحسب كتلة كل جزئ

1. كتلة C_3H_8 =

$$1\text{mol C}_3\text{H}_8 * 44\text{g} = 44\text{g}$$

2. كتلة O_2 =

$$5\text{mol O}_2 * 32\text{g} = 160\text{g}$$

3. كتلة CO_2 =

$$3\text{mol CO}_2 * 44\text{g} = 132\text{g}$$

4. كتلة H_2O =

$$4\text{mol H}_2\text{O} * 18\text{g} = 72\text{g}$$

الآن نطبق قانون حفظ الكتلة

كتلة المواد المتفاعلة = كتلة C_3H_8 + كتلة O_2

$$204 = 160 + 44 =$$

كتلة المواد الناتجة = كتلة CO_2 + كتلة H_2O

$$204 = 132 + 72 =$$

الكتلة المولية لـ C_3H_8

$$[3*12] + [8*1] = 44$$

الكتلة المولية لـ O_2

$$[2*16] = 32$$

الكتلة المولية لـ CO_2

$$[1*12] + [2*16] = 44$$


الكتلة المولية لـ H_2O

$$[2*1] + [1*16] = 18$$

نسبة المولات:-

النسبة المولية :- نسبة بين اعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الكيميائية الموزونة.

مثال/ حدد النسب المولية جميعها لكل من المعادلات الكيميائية الموزونة التالية:



1. النسبة المولية للبوتاسيوم K: 3. النسبة المولية لـ KBr

$$\frac{1mol K}{2mol KBr} \text{ و } \frac{2mol KBr}{1mol Br_2} \quad \text{و} \quad \frac{2mol KBr}{1mol Br_2} \text{ و } \frac{2mol KBr}{1mol K}$$

2. النسبة المولية لـ Br₂

$$\frac{1mol Br_2}{2mol KBr} \text{ و } \frac{1mol Br_2}{1mol K}$$

ص 167

الدرس الثاني:- المعادلات الكيميائية والحسابات

الباب الخامس


5-2

يتطلب حل مسألة الحسابات الكيميائية كتابة معادلة كيميائية موزونة.

المسألة

■ حساب المولات:-

ما عدد مولات CO₂ التي تنتج عن احتراق 10mol من C₃H₈ في كمية وافرة من الاكسجين؟



عدد المولات للمادة المجهولة = $\frac{\text{عدد مولات المادة المجهولة من المعادلة}}{\text{عدد مولات المادة المعروفة من المعادلة}} \times \text{عدد مولات المعطوف من المسألة}$

$$10mol C_3H_8 \times \frac{3mol CO_2}{1mol C_3H_8} = \text{عدد المولات للمادة المجهولة}$$

$$30 mol Co_2 =$$

الحسابات الكيميائية : حساب المول والكتلة

مسألة 1/ احسب كتلة ويعطيني المول (خطوات الحل)

١- نحسب عدد مولات المجهول

$$\text{عدد مولات المادة المجهولة من المعادلة} \times \text{عدد مولات المعلوم من المسألة} = \text{عدد مولات المادة المعلوم من المعادلة}$$

٢- نحسب الكتلة المولية للمجهول.

(عدد الذرات \times الكتلة الذرية من الجدول الدوري)

٣- نخرج المطلوب الا وهو كتلة المجهول .

الكتلة بالجرام = عدد المولات \times الكتلة المولية.

حساب الكتل:

طريقة حل المسألة/

١- نحسب الكتلة المولية للمعلوم .

٢- نحسب عدد مولات المعلوم.

٣- نحسب عدد مولات المجهول.

٤- نحسب الكتلة المولية للمجهول .

٥- نحسب المطلوب الا وهو الكتلة بالجرام للمجهول.

5-3

يتوقف التفاعل الكيميائي عندما تستنفذ اي من المواد المتفاعلة تماما.

المادة المحددة للفاعل: هي التي تحدد سير التفاعل ، وتنفذ اولاً.

المواد المتفاعلة الفائضة : هي التي تبقى فيها جزء لم يتفاعل .

خطوات حل المسألة:-


1. حساب عدد المولات للمادة المتفاعلة الاولى.
2. حساب عدد المولات للمادة المتفاعلة الثانية.
3. قسمة مولات الأكبر على الأصغر.
4. تحديد المادة المحددة.
5. تحديد المادة الفائضة.
6. حساب كتلة الناتج.
7. حساب كتلة المتفاعل من المادة الفائضة.
8. حساب كتلة الفائض.

حل المثال بالكتاب:

الكتلة المولية لـ $P_4 = 123.9$

الكتلة المولية لـ $O_2 = 32$

الكتلة المولية لـ $P_4O_{10} = 284$



$$\frac{25}{123.9} = 0.202 = \text{عدد مولات } P_4$$

$$\frac{50}{32} = 1.56 = \text{عدد مولات } O_2$$

الآن نحدد المادة المحددة والمادة الفائضة بالطريقة التالية

بعد الحسبة الاصغر هو المادة المحددة والاكبر هو المادة الفائضة . إذاً

المادة المحددة للتفاعل هي : P_4

المادة الفائضة هي : O_2

الان نستخرج كتلة الناتج P_4O_{10} : بالطريقة التالية :

$$\begin{array}{ccc} 123.9 & & 284 \\ & \swarrow \searrow & \\ 25 & & ? \end{array}$$

$$57.3 g P_4O_{10} =$$

الان نستخرج كتلة المادة الفائضة بنفس الطريقة السابقة .

$$(في القاعدة هذه الكتلة المولية للمجهول تضرب بالذي قبلة وبعده)$$

$$160 \quad 123.9 \quad ?$$

$$(مثل 160 ضرب بعشرة لان $10 = 2 \times 5$)$$

$$32.3 g O_2 =$$

الان نحسب كمية O_2 الفائضة :

$$32.3 - 50 = 17.7$$

5-4

المردود النظري:- أكبر كمية من الناتج يمكن الحصول عليها من كمية المادة المتفاعلة المعطاة.

المردود الفعلي:- هو كمية المادة الناتجة عند إجراء التفاعل الكيميائي عملياً.

نسبة المردود المئوية:

$$\text{نسبة المردود المئوية} = \frac{\text{المردود الفعلي}}{\text{المردود النظري}} \times 100$$

في المسألة يعطى المردود الفعلي ولاكن لا يعطى المردود النظري

أولاً/ نحسب عدد مولات المجهول

$$\text{عدد المولات للمادة المجهولة} = \frac{\text{عدد مولات المادة المجهولة من المعادلة}}{\text{عدد مولات المادة المعروفة من المعادلة}} \times \text{عدد مولات المعطوف من المسألة}$$

ثانياً/ نضرب عدد مولات المجهول في كتلة المولية .

ومن ثم نطبق على القانون.

6-1

المركبات العضوية:-

س ١/ تكلم عن نظرية العطاء السابقين عن المركبات العضوية.

ج ١/ عندما قبلت نظرية دالتون في بداية القرن التاسع عشر بدأ الكيميائيون يفهمون حقيقة أن المركبات – بما فيها تلك المصنعة من المخلوقات الحية – تتألف من ذرات مرتبة ومرتبطة معاً بتركييب محددة. واستنتج كثير من العلماء خطأ أن عد مقدرتهم على تصنيع المركبات العضوية عائد الى القوة الحيوية. ووفقا لهذا المبدأ فإن المخلوقات الحية (العضوية) لها قوة حيوية غامضة تمكنها من تركيب مركبات الكربون.

س ٢/ ما المقصود بالقوة الحيوية؟

هي قوة غامضة تمكنها من تركيب مركبات الكربون.

س ٣/ ماهو تعريف الكيمياء العضوية والمركب العضوي ؟

الكيمياء العضوية:- هو فرع من فروع الكيمياء لدراسة المركبات العضوية.

المركب العضوي:- هي المركبات التي تحتوي على الكربون ماعدا أكاسيد الكربون والكربيدات والكربونات.

س ٤/ لماذا تم تخصيص فرع باسم المركبات العضوية؟

لوجود الكثير من المركبات العضوية.

س ٥/ ماهو سبب كثرة المركبات العضوية؟

(١) سلاسل متفرعة. (٢) تراكييب حلقية. (٣) تراكييبها معقدة.

س ٦/ ما المقصود بالهيدروكربونات ؟

تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين فقط. ابسط المركبات العضوية.

س ٧/ ماهو أبسط مركب هيدروجيني؟ الميثان.

س ٨/ كيف يمكن تمثيل جزيئات المركب العضوي؟ اذكر مثال؟ مثال/جزيئ الميثان.

(١)الصيغة الجزيئية. (٢) الصيغة البنائية. (٣) نموذج الكرة والعصا. (٤) النموذج الفراغي.

س ٩/ ماهي أقسام الهيدروكربونات وما اساس تقسيمها؟

- (١) المشبع (يحتوي على روابط أحادية)
(٢) غير المشبع (لانة يحتوي على روابط ثنائية وثلاثية)

تنقية الهيدروكربونات:-

س١/ ما هو المصدر الطبيعي للهيدروكربونات؟

الوقود الأحفوري (النفط)

س٢/ ماهي عملية لتقطير التجزيئي وفيما ماذا يستخدم؟

هي عملية فصل مكونات البترول إلى مكونات أبسط منها. من خلال تكتفها عند درجات حرارة مختلفة.

س٣/ متى يمكن الاستفادة من النفط عند استخراجها؟

بعد تكرير النفط.

س٤/ ارسم جدول يوضح جميع نتائج التكرير مع كتابة درجة غليانه واهم المكونات.

م	المكون	درجة الغليان	اهم المكونات
1	غازات	أقل من 400°	CH ₄ إلى C ₄ H ₁₀
2	الجازولين	40-100	C ₅ H ₁₂ إلى C ₁₂ H ₂₆
3	الكيروسين	105-275	C ₁₂ H ₂₆ إلى C ₁₆ H ₃₄
4	زيت التسخين	240-300	C ₁₅ H ₃₂ إلى C ₁₈ H ₃₈
5	زيت التزيت والتشحيم	فوق 300	C ₁₇ H ₃₆ إلى C ₂₂ H ₄₆
6	المخلفات	400	C ₂₀ H ₄₂

س٥/ ماهي عملية التكسير الحراري وما الفائدة منها؟

تحول المكونات الثقيلة إلى الجازولين عن طريق كسر الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر بفعل الحرارة.

الفائدة: صناعة الملابس والانسجة والبلاستيك.

الباب السادس

الدرس الثاني:- الألكانات

ص 206

6-2

الألكانات:- هيدروكربونات تحتوي فقط على روابط أحادية فقط بين الذرات.

الهيدروكربونات : **السلسلة المتماثلة :-** هي سلسلة المركبات التي يختلف بعضها عن بعض في عدد الوحدة المتكررة.

(١) مشبعة : الألكانات (أحادية)

(٢) غير مشبعة : الألكينات : ثنائية

الألكينات : ثلاثية

سؤال/ مركب من الألكانات يحتوي على 10 كربون. الصيغة C_nH_{2n+2}

نكتب الكربون والرقم المرافق له C_{10}

حتى نطلع ذرات H $22 = 2 + 2 \times 10$ تصبح $C_{10}H_{22}$

أسماء الألكانات العشرة الأولى ذات السلاسل المستقيمة

1. ميثان. 2. إيثان 3. بروبان 4. بيوتان 5. بنتان
6. هكسان 7. هبتان 8. هكسان 9. نونان 10. ديكان

سؤال/ بنتان الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية.

الصيغة الجزيئية: C_5H_{12} (5: لان بنتان رقمة 5) (12: لان $12 = 2 + 2 \times 5$)

الصيغة البنائية المكثفة: اولا: نضع في الاطراف CH_3 ثم نرى الباقي ونضعه بالنص كـ CH_2

لو وضعنا CH_3 في كلا الطرفين سيبقى 3 ونمثل بـ CH_2

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ (يجب ان تكون عدها 5 على رقم البنتان)

الصيغة البنائية العادية:

الألكانات ذات السلاسل المتفرعة:

الألكانات البسيطة					
الاسم	الميثيل	الإيثيل	البروبيل	الإيزوبروبيل	البيوتيل
الصيغة البنائية المكثفة	CH_3	CH_3CH_2	$CH_3CH_2CH_2$	CH_3CHCH_3	$CH_3CH_2CH_2CH_2-$


يطلق على أطول سلسلة كربونية متصلة عند تسمية الألكانات المتفرعة السلسلة الرئيسية.

تسمى كل التفرعات الجانبية المجموعات البديلة.

تسمية الألكانات بنظام IUPAC.

- 1- يتم اختيار أطول سلسلة تحتوي التفرع.
- 2- يتم ترقيم ذرات كربون السلسلة من اقرب طرف تفرع.
- 3- يتم كتابة ثنائي أو ثلاثي على حسب عدد مرات تكرار الفرع.
- 4- يكتب رقم الفرع ثم اسمة ثم اسم الالكان.

مثال/



اول خطوة نحدد اطول سلسلة .

ثاني خطوة نرقم من اقرب طرف للتفرع.


ثالث خطوة يتم كتابة ثنائي او ثلاثي حسب تكرار الفرع (هنا لا نكتب شي لانه واحد)

رابع خطوة نكتب رقم الفرع (ثاني خطوة) ثم اسمة (من الجدول ص ٣٠) ثم اسم

الالكان (من الجدول ص ٣٠).

يصبح الاسم: 2 - ميثيل بيوتان.

مثال/



4،2 - ثنائي ميثيل هبتان

مثال/


الألكانات الحلقية:

وهي هيدروكربونات حلقية تحتوي على روابط احادية فقط.

مثال/ بروبان حلقي



بروبان لان بروبان الثالث حسب الجدول . واخترنا بروبان على عدد الاضلاع.



1- ايثيل -2- ميثيل هكسان حلقي

خصائص الالكانات:-

- ١- مركبات غير قطبية.
- ٢- لا تذوب في الماء.
- ٣- غير نشطة كيميائياً.

6-3


(الألكينات)

الصيغة العامة: C_nH_{2n} .


نظام IUPAC للتسمية:-

- ١- يتم اختيار أطول سلسلة تحتوي رابطة مزدوجة.
- ٢- نرقم للأقرب للرابطة المزدوجة.
- ٣- يكتب اسم الفرع ورقمة ثم رقم الرابطة ثم اسم الألكين.


أمثلة/




2- بيوتين . (نبدأ نرقم)



4،4 - ثنائي ميثيل - ٢ - هكسين. نحدد أطول سلسلة ونرقم



2 ، 5 - اكتاديين (داين لان فيه زوجين)



3 - ميثيل - 5،2 - هبتادين

خواص الألكينات واستخداماتها :-

- ١- مواد غير قطبية (مثل الألكانات).
 - ٢- درجات انصهارها وغلبيتها منخفضة.
 - ٣- نشطة فهي أكثر نشاطا من الألكانات. (لان الرابطة الثقبية تزيد من الكثافة الإلكترونية بين ذرتي الكربون)
- الاستعمالات :-** يستعمل الإيثين في انضاج الثمر بجني الفواكة والخضروات ويصنع الإيثين كثير من المنتجات.

(الألكينات)


هي هيدروكربونات غير مشبعة تحتوي على رابطة ثلاثية واحدة أو أكثر بين ذرات الكربون.

الصيغة العامة: C_nH_{2n-2}

أمثلة:-



2- هكساين



4- ميثيل - 2- بنتاين

خواص الألكينات واستخداماتها:-

- ١- للألكينات خصائص فيزيائية وكيميائية شبيهة بالألكينات.
- ٢- الألكينات أكثر نشاطا من الألكينات .

استعمالاته:- الاستيلين يستعمل عادة لأغراض اللحام.

$CH_3 - CH_2$

$CH_2 \quad CH$


$CH \quad C$

6-4

التشكل:- اشراك عدد من الصيغ البنائية في صيغة جزيئية واحدة.

المتشكلات البنائية:-



اكتب المتشكلات البنائية المحتملة للألكان ذي الصيغة الجزيئية C_6H_{14} جميعها ؟



أرسم أربعة متشكلات للصيغة الجزيئية C_4H_8 .



بيوتان حلقي



أرسم أربعة متشكلات للصيغة الجزيئية C_6H_{14} .



أرسم ثلاث متشكلات للألكان ذي الصيغة الجزيئية C_5H_{12} ؟



في الاشكال: كل ركن ياخذ 1C و 2H.

اذا كان الشكل فيه تفرع ما نحسب التفرع

ونحذف H واحدة من الركن لآكن اذا طلع فرعين من نفس الركن نحذف 2H.

6-5

الألكينات والألكينات الحلقية:-


هكسايين حلقى



هكسايين حلقى




هكسان حلقى



4،3 - ثنائى إيثيل هكسايين حلقى

الترقيم هنا ينحصر بين الأزواج



3، ميثيل هكسايين حلقى


المركبات الأروماتية:-

حلقة البنزين تكون بهذا الشكل:


طريقة التسمية:-

بنفس تسمية الألكانات الحلقية


امثلة /



1،4-ثنائى ميثيل بنزين



إيثيل بنزين



ميثيل بنزين

المثال الأول/ لانرقم اذا كان فيه فرع واحد

المثال الثانى / نفس المثال الاول.

المثال الثالث/ نرقم لأنه يوجد فرعين.

{مصطلحات}

المركبات الأروماتية:- هي مركبات عضوية تحتوي على حلقات بنزين جزاء من بناءها.

هي هيدروكربونات تحتوي على روابط أحادية فقط بين الذرات .

مجموعة من المركبات تختلف عن بعضها بصيغة رقمية ثابتة .

أطول سلسلة كربونية متصلة أو مستمرة من ذرات الكربون .

هي التفرعات الجانبية البديلة عن ذرة الهيدروجين في السلسلة المستقيمة .

المركب العضوي الذي يحتوي على حلقة هيدروكربونية .

الهيدروكربونات الحلقية المحنوية على روابط أحادية فقط .

طريقة منتظمة لتسمية المركبات العضوية .

* المفردات الجديدة :

١ -**الالكانات :**

٢ -**السلسلة المقارنه :**

٣ -**السلسلة المستقيمة :**

٤ -**المجموعة البديله :**

٥ -**المركب الحلقى :**

٦ -**الالكانات الحلقية :**

٧ -**نظام IUPAC :**

اكتب أسماء المركبات التالية حسب نظام الأيوباك :

	٧		١
	٨		٢
	٩		٣
	١٠		٤
	١١		٥
	١٢		٦

لخص ثلاث حقائق حول الألكينات بإكمال الفراغات في الجمل التالية :


١ - الألكينات هيدروكربونات غير مشبعة ، تحتوي على رابطة تساهمية **ثنائية** واحدة على الأقل بين ذرات الكربون .

٢ - لا يوجد ألكين بذرة كربون واحدة ، وعليه فإن أبسط ألكين هو جزيء **الإيثين** .

٣ - الصيغة العامة للألكينات هي **CnH2n** .



استخدم قواعد نظام الأيوباك IUPAC لتسمية الصيغ البنائية الآتية :



٢ - اكتب الصيغة البنائية لكل مما يأتي :

(أ) ١-إيثيل -٣-بروبيل بنتان حلقي .

(ب) ١، ٢، ٢، ٤-رباعي ميثيل هكسان حلقي .